

Magitaskolans riktlinjer vid sjukdom och vistelse i skolan

Det är alltid barnets allmäntillstånd som avgör.

- barnet ska orka delta i skolans aktiviteter.

Magitaskolan är en anpassad verksamhet för elever med autism, där elevernas individuella förutsättningar kan innebära att det är svårt att alltid följa hygienrutiner eller snabbt uppmärksamma och hantera symtom som kräkning och diarré. För att minska risken för smittspridning och skapa en trygg och säker skolmiljö har Magitaskolan därför vissa lokala riktlinjer som är mer restriktiva än de generella rekommendationerna. Riktlinjerna utgår från elevernas förutsättningar, verksamhetens behov och ett förebyggande smittskyddsperspektiv.

MAGSJUKA

Både åksjuka, virus, bakterier och parasiter kan ge upphov till akut diarré och/eller kräkning. Virusorsakade infektioner är vanligast. Smittsamheten är oftast stor.

När ska barnet stanna hemma?

- ✓ Barn med magsjuka, diarré och/eller kräkning ska inte vistas på skolan/fritidshemmet.
- ✓ Barnet kan återgå till skolan när det ätit normalt och inte kräcks eller haft diarré under minst 48 timmar.

FÖRKYLNING

Förkylning är en virusinfektion som är mycket vanlig bland barn. Vanliga symtom är snuva, nästäppa, hosta, halsont och ibland feber. Förkylning smittar lätt, framför allt under de första dagarna av infektionen.

När ska barnet stanna hemma?

- ✓ Barnet ska stanna hemma om det har feber, är tydligt påverkat av sin förkylning eller inte orkar delta i skolans aktiviteter.
- ✓ Lätt snuva eller lindrig hosta behöver inte innebära att barnet måste vara hemma, om barnet i övrigt mår bra och orkar delta i verksamheten. Barnet bör dock stanna hemma om symtomen är så uttalade att barnet inte kan delta i verksamheten eller om det finns svårigheter att begränsa smittspridningen.

SPRINGMASK

Alla kan få springmask men det är vanligast hos barn. Ofta märker man att barnet har springmask genom att det kliar åt ändtarmen. Barn kan också få svårt att somna och sova dåligt. Klådan är intensiv, framför allt på kvällen och natten. Det beror på att masken ofta blir mer aktiv när barnet ligger stilla i sängvärmen. Man kan även ha springmask utan klåda eller andra besvär.

När ska barnet stanna hemma?

Vid springmask ska barnet vara hemma i två dygn efter påbörjad behandling enligt Magitaskolans lokala riktlinjer.

HUVUDLÖSS

En huvudlus är 2-4 mm lång, smutsgul, genomskinlig och ganska platt. Lusen lever av blod och suger blod från hårbotten flera gånger per dag. En lus lever ungefär i 1 månad. Varje hona lägger under denna tid många ägg som klistras fast vid hårstråna nära hårbotten. Äggen är ungefär 1 mm stora och kläcks efter cirka en vecka.

När ska barnet stanna hemma?

- ✓ När huvudlöss upptäcks hos ett barn på Magitaskolan kontaktas vårdnadshavare, som får hämta sitt barn snarast.
- ✓ Information lämnas till samtlig personal, som i sin tur informerar vårdnadshavare om att löss förekommer på skolan och att finkamning bör utföras.
- ✓ Barnet ska stanna hemma så länge det finns levande löss i håret. Efter behandling bör håret kontrollkmmas dagligen under den närmaste veckan för att säkerställa att inga levande löss finns kvar.